

Kniperlé précoce

Vass8R10s161-165



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp596

0-596
Kniperlé précoce
8R10s 161-165

~~Photo~~ GrappGenne 2008 Bag p FV

Code Intro : 0Mtp596


Nom Var : Cépage non identifié

Nom Intro : Kniperlé précoce

Emplacement : Vass8R10s161-165







CLOS 8 RANG 10 Souche 161-165

Désignation : *knipoli précoce*

CHARGE : Année :

Véraison : 21-7

Maturité : 22-8-88

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 11
L - M - C

Vigueur : 2

PORT : érig - (1/2) érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 15

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 5 Avec pépins - apyrène

s2 3 JUS : inc. - coloré

s3 5

s4 6

s5 7

ANNEE 1987

NOM Kniperle' precoce bl EMPLACEMENT 8 R10 1161-165

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|-----------|--------------|--------|-----------|------------|-----------|------|-----|-------------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 31.3 | 3.4 | 6 | | 1.6 | 3.6 | 8.6 | | | | |
| 2 | 4 | 27.3 | 31.3 | 5 | | 28.5 | 1.6 | 3.6 | | | | |
| 3 | 2 f | 27.3 | 31.3 | 5 | | 1-6 | 3.6 | 8.6 | 27.7 | 30.7 | 3.8 | 34.8 |
| 4 | 2 | 23.3 | 27.3 | 5 | | 28.5 | 1.6 | 3.6 | | +1 | | +2 |
| 5 | 4 | 27.3 | 31.3 | 4 | | 28.5 | 1.6 | 3.6 | | | | |
| 16 | | | 31.3 | 25 | 15.5 | | 2.6 | | port enge' | | | |
| | | | +4 | | | | -5 | | Vigueur 1.5 | | | |

ANNEE 1988

NOM Kniperle' precoce bl EMPLACEMENT 8 R10 1161-165

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|------------|---------------------|------|------|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 3 | 25.3 | 28.3 | 5 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 14.3 | 21.3 | 3 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 14.3 | 21.3 | 5 | 20 | 21.5 | 25.5 | 27.5 | 21.7 | 25.7 | 28.7 | 22.8 |
| 4 | 2 | 14.3 | 21.3 | 6 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 14.3 | 21.3 | 7 | | | | | | | | |
| | | | 21.3 | | | | 25.5 | | | +1 | | +1 |
| | | | -3 | | | | -6 | | | | | |
| Pourriture : 0 | | | Port : mi-éigé | | | Vigueur : 2 feuille | | | | | | |

ANNEE 1989

NOM Kniperlé précoce
mEMPLACEMENT 8 R₁₀ 161-165

| Souche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 3 | 83 | 13.3 * | 5 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 83 | 13.3 . | 8 | | 18.5 | | 24.5 | | | | |
| 3 | 2 | 83 | 13.3 . | 7 | 21 | 18.5 | 20.5 | 24.5 | 17.7 | 24.7 | 28 | 28-8 |
| 4 | 2 | 83 | 13.3 * | 8 | | 18.5 | -6 | 24.5 | | +1 | | +3 |
| 5 | 2 | 83 | 13.3 * | 0 | | 1 | | | | | | |

Pourriture : 10%

Mill. : 0

Port : enge'

Vigueur : 3

De 13.3.89 - 5

Kriperle précoce OMtp 536 8R10 161-165

Poids Moy 2008

| Maturité | 88 | 87 | 89 | 2008 | Moy |
|--------------|------|------|------|------|----------|
| 8R10 161-165 | 22.8 | 21.8 | 23.8 | 20.8 | +1.8 (4) |

1 Grappe = 84 g
 1 Baie = 1,02 g
 par Souche = 0,84 kg
 IR Noût = 20,2
 Ac Noût = 5
 pH Noût = 3,43

| Débourrement | 88 | 87 | 89 | 2008 | Moy |
|--------------|------|------|------|------|--------|
| 8R10 161-165 | 21.3 | 21.3 | 23.3 | 22.3 | -3 (4) |

| Vigueur | 88 | 87 | 89 |
|--------------|----|-----|----|
| 8R10 161-165 | 2 | 1,5 | 3 |

| Port | 88 | 87 | 89 |
|------|---------|---------|---------|
| | 1/2 rig | 1/2 rig | 1/2 rig |

| Pourriture | 88 | 89 |
|--------------|----|-------------|
| 8R10 161-165 | 0 | 10% 20,5 |

| Millerandage | 88 | 89 |
|--------------|----|----|
| 8R10 161-165 | 0 | 0 |

| Nombre d'yeux | 88 | 87 | 89 | 2008 |
|---------------|----|----|----|------|
| | 13 | 16 | 13 | 37 |

| Nombre de grappes | 88 | 87 | 89 | 2008 |
|-------------------|----|----|----|------|
| | 26 | 25 | 28 | 27 |

| Floraison | 88 | 87 | 89 | 2008 |
|----------------|------|----|------|------|
| Moy = -5,3 (4) | 25.5 | 26 | 25.5 | 20.5 |

| Grappes/10 yeux | 88 | 87 | 89 | 2008 |
|-----------------|----|----|----|------|
| | 20 | 16 | 22 | 7 |

| Véraison | 88 | 87 | 89 | 2008 |
|--------------|------|------|------|------|
| Moy = +1 (4) | 25.7 | 30.7 | 21.7 | 31.7 |

| Taille des grappes | Compacité | Taille des baies | Forme | Couleur | Saveur | Jus | Pépin |
|--------------------|-------------|------------------|-------|------------|--------|-----|-----------|
| 8R10 161-165 | 1 (4) cm | C | m | (15) cm | sph | Bl | s in avec |

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Knipperle' précoce
el 8 R 10 s 161-165 (s. 161)*

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - ^{sur N} cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - ^{1^e} fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Knipéré pécoce

8 R 100. 161-165 (s. 161)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - ^{base} rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Knipperlé précoce

8 R 400-164-165 (s. 161)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 173.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -
partiellement - totalement.

-Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *Kniperlé précoce*

Emplacement : *Clos 8 R no 161-165 (p 161)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. (dimensions : 15 x 15).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2. ou
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*un peu faible
pas de grappe valable
en 85*

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Kniperlé précoce
8 R 10 s. 161-165 (s 161)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 12 x).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière - irrégulière (dimensions : x).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Kniperle précoce
8 R 10 s 161-165 (2-1)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 42 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *Kniperté précoce*

Emplacement : *8R10 s. 161-165*

Angle des nervures : 1 - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉒ - ㉓ - ㉔ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉕
Sinus pétiolaire ouvert : ㉖
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉗ - 33 - 34 - ㉘ - 36 - 37 - 38 - ㉙
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉕ - en U : ㉖ - autre : ㉗
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉘
Dents : forme : ㉙ - ㉚
Dents (angle) : ㉛ - ㉜ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - ㉞ - ㉟
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㉟ - ㊱ - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊱ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊱ - ㊱ - 65 - ㊱ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 grappgen08 Observateur :
CodeIntro : 0Mtp596 NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction : Kniperlé précoce Emplacement :Vass8R10s161-165

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Taille longue 11/3 appait° des feuilles

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 10 | | 3/3 | 15 | |
| 2 | 4 | | 3/3 | | |
| 3 | 8 | | 3/3 | 10 mangé | |
| 4 | 6 | | 1/3 | 0 mangé | |
| 5 | 9 | | 1/3 | 2 mangé | |
| Moyenne | 37 | | 2/3 | 27 | 7 |

-8

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 20/5 | | 24/07 | 31/07 | 20/08 | |

♀

Débourrement 1/5.

proche 5/5/18
" 5/5

-4

+1

+1

Formulaire de description 2 / 8
(stade floraison)

Année : 2008

Observateur : TD

Code cépage : 0Mtp596

Code introduction :

Nom introduction : Kniperlé précoce

Emplacement : Vass8R10s161-165

Bourgeonnement

oiv 001 **forme** : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 **distribution pigmentation anthocyanique** : absente 1 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 **intensité pigmentation anthocyanique** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 005 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 **couleur face supérieure** (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 **densité poils couchés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 054 **densité poils dressés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 **densité poils couchés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 056 **densité poils dressés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil : étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8
(stade floraison)

Année : 2008

Observateur : TD

Code cépage : Code introduction : 0Mtp596

Nom introduction : **Kniperlé précoce**

Emplacement : Vass8R10s161-165

Rameau herbacé

oiv 006 **port** : érigé 1 - demi-érigé **3** - horizontal **5** - demi-retombant **7** - retombant **9**.

oiv 351 **vigueur rameaux** : très faible **1** - faible **3** - moyenne 5 - forte 7 - très forte **9**.

oiv 007 **couleur face dorsale entrenoeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge 3.

oiv 009 **couleur face dorsale noeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge 3.

oiv 008 **couleur face ventrale entrenoeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge 3.

oiv 010 **couleur face ventrale noeuds** : verte **1** - verte à raies rouges **2** - rouge 3.

oiv 014 **densité poils couchés entrenoeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne **5** - forte **9**.

oiv 012 **densité poils dressés entrenoeuds** : absence 1 - présence **9**.

oiv 013 **densité poils couchés noeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne **5** - forte **9**.

oiv 011 **densité poils dressés noeuds** : absence 1 - présence **9**.

oiv 015 **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible **1** - faible 3 - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 016 **distribution vrilles** : discontinue (2 ou moins) 1 - subcontinue ou continue (3 ou plus) **2**.

oiv 017 **longueur vrilles** : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) **3** - moyennes (20cm) **5** - longues (25cm) **7** - très longues (>30cm) **9**.

Inflorescence

oiv 151 **sexe de la fleur** : mâle **1** - mâle à hermaphrodite **2** - hermaphrodite **3** - femelle à étamines érigées **4** - femelle à étamines reflexes **5**.

oiv 152 **niveau insertion 1° inflorescence** : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud **2**.

oiv 153 **nombre inflorescence/rameau** : 1 ou moins **1** - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois **3** - plus de trois **4**.

oiv 155 **inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base** : absence **1** - présence 9.

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) **1** - faible (11-30%) **3** - moyen (31-50%) **5** - élevé (51-70%) **7** - très élevé (>80%) **9**.

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie **1** - côtelée 2

000-10 **Villosité spéciale du rameau herbacé** : épines ou analogues **1** - poils massifs **2** - aucune 3.

000-21 **Couleur des vrilles** : jaune **1** - rouge clair **2** - rouge foncé **3** - vert 4.

Bouton floral : petit **1** - moyen **2** - gros **3**.

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

Année : 2008 Observateur : F D
Code cépage : Code introduction : 0Mtp596
Nom introduction : Kniperlé précoce Emplacement : Vass8R10s161-165

| LIMBE | | | | | | |
|---------|---|----------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Code | Descripteur | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Oiv 065 | Taille | Très petite | Petite | Moyenne | Grande | Très grande |
| Oiv 067 | Forme du limbe | 1-Cordiforme | 2-Cunéiforme | 3-Pentagon. | 4-Orbicul. | 5-Rénif. |
| Oiv 068 | Nombre de lobes | 1-Entière | 2-Trois | 3-Cinq | 4-Sept | 5- + de sept |
| Oiv 069 | Couleur face supérieure limbe | | Vert clair | Vert moyen | Vert foncé | |
| Oiv 070 | Pigmentation anthocyanique (rouge) des nervures, face supérieure | 1- Nulle | 2- Point pétiolaire | 3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- Après 1 ^{ère} bifurc. | |
| Oiv 071 | Pigmentation anthocyanique (rouge) de nervures, face inférieure | 1- Nulle | 2- Point pétiolaire | 3- Jusqu'à 1 ^{ère} bifurc. | 4- Après 1 ^{ère} bifurc. | |
| Oiv 074 | Profil du limbe | 1-Plan | 2-En V | 3-Involuté | 4-Révoluté | 5-Tourmenté |
| Oiv 073 | Ondulation du limbe (entre nerv I ou II) | Absente | | | | Présente |
| Oiv 072 | Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II) | Absente | | | | Présente |
| Oiv 075 | Cloûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre) | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 084 | Densité p. couchés entre nerv. face sup. | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 085 | Densité p. dressés entre nerv. face inf. | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 086 | Densité p. couchés des nerv. face sup. | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 087 | Densité p. dressés des nerv. face inf. | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 088 | Villosité couchée nerv.principales face sup | Absente | | | | Présente |
| Oiv 089 | Villosité dressée nerv. principales face sup | Absente | | | | Présente |
| Vassal | Densité p. couchés limbe face sup. | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Vassal | Densité p. dressés limbe face sup. | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |

| PETIOLE | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|---------------------|------------|---------|-----------|--------------------|
| Oiv 090 | Densité poils couchés | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 091 | Densité poils dressés | Nulle à t. fb. | Faible | Moyenne | Forte | Très forte |
| Oiv 093 | Longueur pétiole p/r nervure médiane | Beaucoup plus court | Plus court | Égal | Plus long | Beaucoup plus long |

| SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7) | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---|----------------|----------|----------------------|
| Oiv 079 | Ouverture | 1-très ouvert | 2- ouvert | 3- peu ouvert | 4- fermé | 5-lobes chevauchants |
| Oiv 080 | Forme de la base | 1- en U | 2- en accolade | 3- en V | | |
| Oiv 81-1 | Dent sur le bord | 1- Absence | 2- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents | | | |
| Oiv 81-2 | Base dégarnie | 1- Absence | 2- sur 1 côté | 3- sur 2 côtés | | |

| SINUS LATERAUX SUPERIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7) | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--|
| Oiv 082 | Ouverture | 1- absence de sinus | 2- ouverts | 3- fermés | 4- lobes très chevauchants | |
| Oiv 83-1 | Forme | 1- en U | 2- en accolade | 3- en V | | |
| Oiv 83-2 | Dent | 1- Absence | 2- Présence fréquente | | | |

| DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7) | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Oiv 076 | Forme | 1- côtés concaves | 2- côtés rectilignes | 3- notations 2 + 4 | 4- côtés convexes | 5- un côté concave et l'autre convexe |
| Oiv 077 | Taille | Très petites | Petites | Moyennes | Grandes | Très grandes |
| Oiv 078 | Rapport longueur/largeur | Très courtes | Courtes | Moyennes | Longues | Très longues |

| AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Oiv 501 | Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.) | Très faible (<10%) | Faible (11-30%) | Moyen (31-50%) | Élevé (51-70%) | Très élevé (>80%) |

Formulaire de description 5 / 8

(stade maturité)

Année : 2008

Observateur : SL (Descript^o / table après récolte)

Code cépage :

Code introduction : 0Mtp596

Nom introduction : Kniperlé précoce

Emplacement : Vass8R10s161-165

*Grappe*oiv 202 **longueur** : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 - longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 11,5 cmoiv 203 **largeur** : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 - large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.) : 7 cmoiv 204 **compacité** : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 - long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9.oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.oiv 208 **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3.oiv 209 **présence d'un aileron** : absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3.*Baie*oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 11 mmoiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) : 11 mmoiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme 1 - uniforme 3.oiv 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme 2.oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.oiv 229 **ombilic** : peu apparent 1 - apparent 2.oiv 230 **coloration de la pulpe** : non colorée 1 - colorée 2.oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse 1 - juteuse 2.oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.oiv 236 **saveur** : aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5.oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. 3 à 4 mmoiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.oiv 242 **longueur pépins** : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 7 mmoiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes 1 - présentes 2.Vassal : 000-11 **axe de la rafle de la grappe** : non coloré 2 - coloré 1.000-18 **région ombilicale** : déprimée 1 - non déprimée 2.**Millerandage** : nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9.

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2008

GrapGene06

Observateur : TD

Code cépage : 0

Code introduction : **0Mtp596**

Nom introduction : Kniperlé précoce Emplacement : **Vass8R10s161-165**

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire **1** - elliptique 3 - aplatie **5**.

oiv 102 **surface** : unie **1** - côtelée **2** - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune **1** - brunâtre 2 - rouge violacé **3** - gris **4**.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes **9**.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence **9**.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence **9**.

oiv 351 **vigueur *** : très faible **1** - faible 3 - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible **1** - faible 3 - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) **1** - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) **5** - longs (150mm) **7** - très longs (>180mm) **9**.

Valeur absolue : 80

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) **1** - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) **5** - grand (14mm) **7** - très grand (>17mm) **9**.

Valeur absolue : 8

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.

Vassal :

Nœuds : aplatis **1** - moyens 2 - saillants **3**.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente **2** - présente **3**.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »